

『性感染症 診断・治療ガイドライン 2026』



第 1 刷正誤表

このたびは上記書籍をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書に以下の誤りがございました。訂正させていただきますとともに、謹んでお詫び申し上げます。

2026年4月28日現在

診断と治療社 編集部

ページ	128	箇所	図 2
誤	 <p>性器ヘルペス</p> <p>初発</p> <p>5日～10日間で内服、点滴で十分に治療</p> <p>再発</p> <p>再発回数で治療方法を選択</p> <p>前駆症状不明</p> <p>5日間で内服</p> <p>概ね年6回以上再発</p> <p>VACVによる再発抑制療法 1年間継続し、延長を考慮</p> <p>概ね年3回未満</p> <p>PIT ファムシクロビル 1,000mg×2回 or アメナメビル 1,200mg×1回</p> <p>年3回未満</p> <p>PIT アメナメビル 1,200mg×1回</p> <p>図 2 性器ヘルペス治療アルゴリズム</p>		
正	 <p>性器ヘルペス</p> <p>初発</p> <p>5日～10日間で内服、点滴で十分に治療</p> <p>再発</p> <p>再発回数で治療方法を選択</p> <p>前駆症状不明</p> <p>5日間で内服</p> <p>再発の初期症状を正確に判断可能な場合</p> <p>概ね年6回以上再発</p> <p>VACVによる再発抑制療法 1年間継続し、延長を考慮</p> <p>概ね年3回程度</p> <p>PIT ファムシクロビル 1,000mg×2回 or アメナメビル 1,200mg×1回</p> <p>再発回数は問わない</p> <p>PIT アメナメビル 1,200mg×1回</p> <p>図 2 性器ヘルペス治療アルゴリズム</p>		